

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

## DOC+フェスゴ皮下注療法

3 週毎 コース予定疾患名 乳 癌

主治医 指導医 HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )

スケジュール

		day 1
フェスゴ	初回投与 フェスゴ IN (8分以上かけて)	↓
	2回目以降 フェスゴ MA (5分以上かけて)	
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	↓

【注意】 \* フェスゴは大腿部以外への投与は避け、前回の注射部位から2.5cm以上離すこと

\* 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
  - ② フェスゴ 初回用量(IN)投与の場合は 8分以上かけて 皮下注  
維持用量(MA)投与の場合は 5分以上かけて
  - ☆初回投与時は30分間、以降は忍容性が良好であれば15分間経過観察する
  - ③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
  - ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 朝 内服

DOC+フェスゴ皮下注療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							