

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DOC+フェスゴ皮下注療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day 1
フェスゴ	初回投与 フェスゴ IN (8分以上かけて)	↓
	2回目以降 フェスゴ MA (5分以上かけて)	
ドセタキセル	75 mg/m ²	↓

【注意】 * フェスゴは大腿部に投与すること、また前回の注射部位から2.5cm以上離すこと

* 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② フェスゴ 初回用量 IN の場合は 8分以上かけて 大腿部に皮下注
維持用量 MA の場合は 5分以上かけて
- ③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ④ ドセタキセル + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

DOC+フェスゴ皮下注療法

	コース						
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース						
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース						
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース						
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース						
月日	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							