| | |
|---|---|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

# PTX weekly+ フェスゴ皮下注療法

## 3 週毎　　コース予定

## 疾患名　乳癌

**主治医**　　**指導医**

HBs抗原(　)、HBs抗体(　)、HBc抗体(　)

スケジュール

| | | | day1 | day8 | day15 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェスゴ | 初回投与 | フェスゴ IN（8分以上かけて） | ↓ | | |
| | 2回目以降 | フェスゴ MA（5分以上かけて） | | | |
| パクリタキセル | | 80 mg/$m^2$ | ↓ | ↓ | ↓ |

【注意】 ＊ フェスゴは大腿部に投与すること、また前回の注射部位から2.5cm以上離すこと

＊ 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する

＊ パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること

＊ アルコール過敏　有 ・ 無

通常量より減量する際の理由

（レジメン）

Day 1

① 生食 500 mLで血管確保　　維持(20 mL/時間)

② フェスゴ　初回用量 IN の場合は 8分以上かけて　　大腿部に皮下注

維持用量 MA の場合は 5分以上かけて

☆初回投与時は30分間、以降は忍容性が良好であれば15分間経過観察する

③ レスタミン錠10 mg 5錠　　内服

④ デキサメタゾン 6.6 mg　＋ 生食 20 mL　　側管静注

⑤ ファモチジン 20 mg　　側管静注

PTX weekly+フェスゴ皮下注療法

☆ 30 分後より

⑥ パクリタキセル　＋ 5%ブドウ糖 250 mL　点滴静注60分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 8,15

① 生食 500 mLで血管確保　維持(20 mL/時間)

② レスタミン錠10 mg 5錠　内服

③ デキサメタゾン 6.6 mg　＋ 生食 20 mL　側管静注

④ ファモチジン 20 mg　側管静注

☆ 30 分後より

⑤ パクリタキセル　＋ 5%ブドウ糖 250 mL　点滴静注60分(250 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

| | コース | | | コース | | | コース | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | day1 | day8 | day15 | day1 | day8 | day15 | day1 | day8 | day15 |
| 月　日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| フェスゴ<br>開始時刻 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | |
| パクリタキセル<br>開始時刻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 確認 | | | | | | | | | |

| | コース | | | コース | | | コース | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | day1 | day8 | day15 | day1 | day8 | day15 | day1 | day8 | day15 |
| 月　日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| フェスゴ<br>開始時刻 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | |
| パクリタキセル<br>開始時刻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 確認 | | | | | | | | | |