

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PTX weekly+ フェスゴ皮下注療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 指導医 HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )  
スケジュール

		day1	day8	day15
フェスゴ	初回投与 フェスゴ IN (8分以上かけて)	↓		
	2回目以降 フェスゴ MA (5分以上かけて)			
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓

- 【注意】 \* フェスゴは大腿部以外への投与は避け、前回の注射部位から2.5cm以上離すこと  
\* 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は改めて初回量(IN)を投与する  
\* パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DHEPフリー点滴セットを使用すること  
\* アルコール過敏 有・無

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② フェスゴ 初回用量(IN)投与の場合は 8分以上かけて 皮下注  
維持用量(MA)投与の場合は 5分以上かけて
- ③ レスタミン錠(10 mg) 5 錠 内服
- ④ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ⑤ ファモチジン 20 mg 側管静注

☆ 30 分後より

⑥ パクリタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 8, 15

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② レスタミン錠(10 mg) 5 錠 内服

③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注

④ ファモチジン 20 mg 側管静注

☆ 30 分後より

⑤ パクリタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注60分(250 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓			↓			↓		
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓			↓			↓		
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓			↓			↓		
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									