

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

サシツズマブ ゴビテカン療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医

指導医

HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体()

スケジュール

		day1	day8
トロデルビ(サシツズマブ ゴビテカン)	10 mg/kg	↓	↓

【注意】 * 初回は180 分かけて点滴静注する。初回の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60～120分に短縮できる。

* サシツズマブ ゴビテカンを希釈した輸液バッグは遮光すること。

☆通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1, 8

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服
- ③ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 100 mL 点滴静注30分(200 mL/時間)
- ④ トロデルビ + 生食 250 mL 点滴静注(180～60分)

希釈後最終濃度が1.1～3.4 mg/mLとなるように生食液量を調節する

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

サシツズマブ ゴビテカン療法

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トロデルビ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								