

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Eribulin +フェスゴ皮下注療法

3週毎 コース予定

疾患名 乳癌

主治医

指導医

HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )

スケジュール

		day 1	day 8
フェスゴ	初回投与	フェスゴ IN	↓
	2回目以降	フェスゴ MA	
ハラヴェン(エリブリン)		1.4 mg/m <sup>2</sup>	↓

- 【注意】
- \* フェスゴは大腿部に投与すること、また前回の注射部位から2.5 cm以上離すこと
  - \* 前回投与より6週間未満の時は維持量(MA)を、6週間以上の時は初回量(IN)を投与すること
  - \* エリブリンを生食に希釈して投与する際は、0.02 mg/mL未満の濃度に希釈しないこと
  - \* 投与量が1 mg以下の場合、希釈液の量を調節すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
  - ② フェスゴ 初回用量 IN の場合は 8分以上かけて 大腿部に皮下注  
維持用量 MA の場合は 5分以上かけて  
☆初回投与時は30分間、以降は忍容性が良好であれば15分間経過観察する
  - ③ デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
  - ④ ハラヴェン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)
- ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day 8

- ① 生食 250 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ハラヴェン + 生食 50 mL 点滴静注5分(600 mL/時間)

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース目		コース目		コース目	
	day 1	day 8	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓		↓		↓	
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース目		コース目		コース目	
	day 1	day 8	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓		↓		↓	
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース目		コース目		コース目	
	day 1	day 8	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓		↓		↓	
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース目		コース目		コース目	
	day 1	day 8	day 1	day 8	day 1	day 8
月日	/	/	/	/	/	/
フェスゴ 開始時刻	↓		↓		↓	
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

