

CDDP+S-1 療法

- ④ パロノセトロン 0.75 mg 1 V + デキサメタゾン 9.9 mg (3 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ⑤ シスプラチン + 生食 350 mL 点滴静注 120 分 (240 mL/時間)
*生食 150 mL をバッグから前もって抜いておく
- ⑥ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注 30 分 (400 mL/時間)
- ⑦ 生食 500mL + L-アスパラギン酸 K10mEq + 硫酸 Mg 補正液 4mEq 点滴静注 120 分 (250 mL/時間)
- ⑧ 生食 500 mL 点滴静注 120 分 (250 mL/時間)
- (⑨⑩ 生食 500 mL 尿量をみて必要により追加)

day 9, 10

アプレピタントカプセル (80 mg) 1C 1×朝 内服

day 9-11

デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼 内服

day 1- 21

エスワン 2×朝・夕食後 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day8	day8	day8	day8	day8	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day8	day8	day8	day8	day8	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						