

SOX 療法[L-OHP:100 mg/m<sup>2</sup>]

ID  
氏名  
年齢  
科名

病棟

# SOX 療法[L-OHP:100 mg/m<sup>2</sup>]

## 3 週毎 コース予定

疾患名 胃癌

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

### スケジュール

《注射》		day1	
オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	↓	
-----			
《内服》		day1(夕)	day15(朝) 《7日間休薬》
エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル)		↓..... ↓	←————→

### エスワン

体表面積に応じて右表により  
1日量を決定する。  
1日2回朝夕食後に分服し、  
day1 夕～15 朝の2週間投与する。

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80 mg/day
1.25 m <sup>2</sup> 以上 ~ 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100 mg/day
1.5 m <sup>2</sup> 以上	120 mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

### day1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② パロノセトロン 0.75mg 1V + 生食 20mL 側管静注  
 デキサメタゾン 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ③ オキサリプラチン + デキサメタゾン 6.6mg (2 mL) + 5%ブドウ糖 250 mL  
点滴静注 120 分 (125 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day 2, 3 必要時 デキサメタゾン錠 8 mg/日 内服

day1(夕)- 15(朝) エスワン 2×朝夕食後 内服

SOX 療法[L-OHP:100 mg/m<sup>2</sup>]

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					