

PTX[Alb 懸濁型]療法(3 投 1 休)

ID
氏名
年齢
科名
病棟

PTX[Alb 懸濁型]療法(3 投 1 休)

4 週毎 コース予定

疾患名 胃癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	8	15	22
アブラキサン(パクリタキセル[アルブミン懸濁型])	100 mg/m ²	↓	↓	↓	休

- 【注意】 * 投与時、インラインフィルターは使用しないこと。
 * パクリタキセル(アルブミン懸濁型)は特定生物由来製品であるため同意を取得すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 8, 15

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
 ② デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL)+ 生食 20 mL 側管静注

◎メインの生食でフラッシュ

- ③ アブラキサン + 生食 適量 点滴静注 30 分

* アブラキサン 1 バイアルに対し生食 20 mL で懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り、
 空の点滴バッグ(残った生食はすべて抜取る)に注入する。

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

PTX[A1b 懸濁型]療法(3 投 1 休)

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						