

DOC+S-1 療法(術後補助)

ID
氏名
年齢
科名
病棟

DOC+S-1 療法(術後補助)

3週毎 6コース予定

疾患名 胃癌(術後補助)

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

1コース開始前

《内服》 day1 day14 《7日間休薬》
 エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル) ↓.....↓ ↔

1~6コース

《注射》	day1		
ドセタキセル	↓		
40 mg/m ²			
《内服》	day1	day14	《7日間休薬》
エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル)	↓.....↓		↔

6コース終了後

《内服》 day1 day28 《14日間休薬》
 エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル) ↓.....↓ ↔

【注意】

- * 1コース開始前にエスワンを14日間連日投与し、その後7日間休薬すること
- * 6コース終了後は、手術1年後までエスワン(28日間連日投与し、その後14日間休薬)を単独投与する

エスワン [体表面積に応じて下表により1日量を決定する。
 1日2回朝夕食後に分服し、Day1~14の2週間投与する。]

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	80 mg/day
1.25 m ² 以上 ~ 1.5 m ² 未満	100 mg/day
1.5 m ² 以上	120 mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

DOC+S-1 療法(術後補助)

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60分 (250 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Day 1-14 エスワン 2×朝・夕食後 内服

Day 2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース
	Day1	Day1	Day1	Day1	Day1	Day1
月日	/	/	/	/	/	/
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						