

ID

氏名

年齢

科名

病棟

Zolbetuximab+CapeOX療法

3 週毎 コース予定

疾患名 胃癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

《注射》		day 1	day 15
ピロイ(ゾルベツキシマブ)	初回投与	800 mg/m ²	↓
	2回目以降	600 mg/m ²	
オキサリプラチン		130 mg/m ²	↓
《内服》		(夕)	(朝) 《7日間休薬》
カペシタビン		↓ 	↓ ↔

【注意】 * 他剤使用時はゾルベツキシマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

* ゾルベツキシマブはインラインフィルター(0.2 μm)を用いて投与すること。

* ゾルベツキシマブは、調製後 6 時間以内に投与を終了すること。

* GLOW試験では、オキサリプラチンは最大 8 回投与。

カペシタビン

体表面積に応じて右表により

1日量を決定する。

体表面積	1 日投与量
1.36 m ² 未満	2,400 mg/day
1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満	3,000 mg/day
1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満	3,600 mg/day
1.96 m ² 以上	4,200 mg/day

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

* 初回投与は必ず入院で実施

① 生食500 mLにて血管確保

維持(20 mL/時間)

② デザレックス5 mg _____錠 内服(初回および2回目の投与時は推奨)

③ デキサメタゾン9.9 mg + 生食20 mL

側管静注

④ パロノセトロン0.75 mg + アロカリス235 mg + 生食100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

⑤ ビロイ + 注射用水 適量 + 生食 適量 (10倍希釈)

* 注:投与量が1200 mgを超える時はテルモ生食1 Lを使用

【800 mg/m² 投与時: mg】

【600 mg/m² 投与時: mg】

【初回投与 (800 mg/m²投与時)】

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (100 mg/m²/時間) で点滴静注

100 mg/m²/時間で60分点滴静注した後、患者の忍容性が良好であれば

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (200 mg/m²/時間) で点滴静注

200 mg/m²/時間で60分点滴静注した後、患者の忍容性が良好であれば

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (300 mg/m²/時間) で点滴静注

300 mg/m²/時間で60分点滴静注した後、患者の忍容性が良好であれば

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (400 mg/m²/時間) で点滴静注

【2回目以降 (600 mg/m²投与時)】

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (75 mg/m²/時間) で点滴静注

75 mg/m²/時間で30～60分点滴静注した後、患者の忍容性が良好であれば

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (150 mg/m²/時間) で点滴静注

150 mg/m²/時間で30～60分点滴静注した後、患者の忍容性が良好であれば

◎ 輸液ポンプにて mL/時間 (300 mg/m²/時間) で点滴静注

◎ メインの生食でフラッシュ

⑥ オキサリプラチン

+ デキサメタゾン6.6 mg + 5%ブドウ糖250 mL

点滴静注120分(125 mL/時間)

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 0 - 4 (必要時) オランザピン 5 mg 1×夕食後 内服

day 2 - 4 デキサメタゾン 8 mg 2×朝昼 内服

day1(タ)-15(朝) カペシタビン 2×朝夕食後 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
ビロイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
ビロイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
ビロイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/
ビロイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

ビロイ点滴速度換算表【初回:800 mg/m ² 】						
体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴投与液量(mL) [濃度:2.0 mg/mL]	投与速度(mL/時)			
			0～60分	60～120分	120～180分	180分～
			100mg/m ² /h	200mg/m ² /h	300mg/m ² /h	400mg/m ² /h
1.0	800	400	50	100	150	200
1.1	880	440	55	110	165	220
1.2	960	480	60	120	180	240
1.3	1040	520	65	130	195	260
1.4	1120	560	70	140	210	280
1.5	1200	600	75	150	225	300
1.6	1280	640	80	160	240	320
1.7	1360	680	85	170	255	340
1.8	1440	720	90	180	270	360
1.9	1520	760	95	190	285	380
2.0	1600	800	100	200	300	400

ビロイ点滴速度換算表【2回目以降:600 mg/m ² 】						
体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴投与液量(mL) [濃度:2.0 mg/mL]	投与速度(mL/時)			
			0～60分	60～120分	120分～	
			75mg/m ² /h	150mg/m ² /h	300mg/m ² /h	
1.0	600	300	38	75	150	
1.1	660	330	41	83	165	
1.2	720	360	45	90	180	
1.3	780	390	49	98	195	
1.4	840	420	53	105	210	
1.5	900	450	56	113	225	
1.6	960	480	60	120	240	
1.7	1020	510	64	128	255	
1.8	1080	540	68	135	270	
1.9	1140	570	71	143	285	
2.0	1200	600	75	150	300	