

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Capecitabine+Bevacizumab 療法

3 週を1コース _____ コース予定

疾患名 大腸癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day1		
ベバシズマブ	7.5mg/kg	↓		

《内服》		day1(夕)	day15(朝)	《7 日間休薬》
カペシタビン		↓ ↓		↔

【注意】 *ベバシズマブの点滴時間は初回投与時は 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行ってよい。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でもよい。

カペシタビン [体表面積に応じて下表により 1 日量を決定する。
1 日 2 回朝夕食後に分服し、Day1~14 の 14 日間投与し、7 日間休薬する。]

体表面積	1 日用量
1.36 m ² 未満	2,400mg/day
1.36 m ² 以上~1.66 m ² 未満	3,000mg/day
1.66 m ² 以上~1.96 m ² 未満	3,600mg/day
1.96 m ² 以上	4,200mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day1

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② ベバシズマブ + 生食 適量 (全量 100mL) 点滴静注(90 ~ 30分)

Day1(夕)-15(朝) カペシタビン 2×朝・夕食後

Capecitabine+Bevacizumab 療法

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

Capecitabine+Bevacizumab 療法

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ベバシズマブ	↓	↓	↓	↓
開始時間				
確認				