

ID

氏名

年齢

科名

病棟

Panitumumab 療法

2 週毎

疾患名 結腸・直腸癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

	day1	day15	day29	
	1回目	2回目	3回目	...
ベクティビックス(パニツムマブ) 6 mg/kg	↓	↓	↓	...

【注意】 * インラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を用いて投与すること

* 通常、生食で希釈し全量を 100 mL にして 60 分以上かけて点滴静注する

(1回投与量が 1000mg を超える場合は全量 150 mL とし、90 分以上かけて投与する)

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

① 生食 500 mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)

② ベクティビックス + 生食 適量 (全量 100 mL) 点滴静注 60 分

(1回投与量が 1000 mg を超える場合は全量 150 mL とし、90 分以上かけて投与する)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

Panitumumab 療法

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							

	回目	回目	回目	回目	回目	回目	回目
月日	/	/	/	/	/	/	/
ベクティビックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							