

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

TAS-102+Bevacizumab 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 大腸癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》	day1	15
ベバシズマブ 5mg/kg	↓	↓

《内服》	day1 ...5 6 7 8 ...12 13 14	《14日間休薬》
ロンサーフ(トリフルリジン/チピラシル)	↓...↓ 休 休 ↓...↓ 休 休	←————→

【注意】 *ベバシズマブの点滴時間は初回投与時 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行ってよい。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でもよい。

ロンサーフ

体表面積に応じて右表により

1 日量を決定する。

()mg/day

体表面積	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.07 m ² 未満	70mg/day
1.07 m ² 以上～1.23 m ² 未満	80mg/day
1.23 m ² 以上～1.38 m ² 未満	90mg/day
1.38 m ² 以上～1.53 m ² 未満	100mg/day
1.53 m ² 以上～1.69 m ² 未満	110mg/day
1.69 m ² 以上～1.84 m ² 未満	120mg/day
1.84 m ² 以上～1.99 m ² 未満	130mg/day
1.99 m ² 以上～2.15 m ² 未満	140mg/day
2.15 m ² 以上	150mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 15

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② ベバシズマブ + 生食 適量 (全量 100mL) 点滴静注 90 ~ 30 分

day 1 - 5 ロンサーフ 2×朝・夕食後 内服

day 8 - 12 ロンサーフ 2×朝・夕食後 内服

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								