

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

TAS-102(5投9休) + Bevacizumab 療法

《消化器外科専用》

4週毎 コース予定

疾患名 大腸癌

主治医 指導医 HBs抗原(+ -) HBc抗体(+ -) HCV抗体(+ -)

スケジュール

《注射》	day1	day15
ベバシズマブ	5 mg/kg ↓	↓

《内服》	day1...5 (9日間休薬)	15...19 (9日間休薬)
ロンサーフ(トリフルリジン/チピラシル)	↓.....↓ ←-----→	↓.....↓ ←-----→

【注意】*ベバシズマブは初回投与時 90 分かけて点滴静注し、2 回目の投与は 60 分間で行ってよい。
それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でもよい。

<ロンサーフ>

体表面積に応じて右表により
1 日量を決定する。()mg/day

体表面積	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.07 m ² 未満	70 mg/day
1.07 m ² 以上~1.23 m ² 未満	80 mg/day
1.23 m ² 以上~1.38 m ² 未満	90 mg/day
1.38 m ² 以上~1.53 m ² 未満	100 mg/day
1.53 m ² 以上~1.69 m ² 未満	110 mg/day
1.69 m ² 以上~1.84 m ² 未満	120 mg/day
1.84 m ² 以上~1.99 m ² 未満	130 mg/day
1.99 m ² 以上~2.15 m ² 未満	140 mg/day
2.15 m ² 以上	150 mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

TAS-102(5投9休) + Bevacizumab 療法

(レジメン)

day 1, 15

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ベバシズマブ + 生食 適量(全量 100 mL) 点滴静注 90~30分

day 1 - 5, 15 - 19 ロンサーフ 2×朝夕食後 内服

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								