

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

SOX + Bevacizumab療法

3 週毎 コース予定

疾患名 大腸癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

《注射》	day 1	
ベバシズマブBS	7.5mg/kg	↓
オキサリプラチン	130 mg/m ²	↓
《内服》	day 1(夕)	day 15(朝) 《7日間休薬》
エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル)	↓	↓ ←————→

【注意】 * ベバシズマブの点滴時間は初回投与時90分かけて点滴静注、2回目の投与は60分間で行ってよい。それ以降は忍容性が良好であれば、30分間投与でもよい。

エスワン

体表面積に応じて右表により

1日量を決定する。

1日2回朝夕食後に分服し、

day1夕～15朝の2週間投与する。

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	80 mg/day
1.25 m ² 以上 ~ 1.5 m ² 未満	100 mg/day
1.5 m ² 以上	120 mg/day

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② パロノセトロン 0.75mg + デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
 - ③ ベバシズマブ + 生食 適量(全量100 mL) 点滴静注(90～30分)
 - ④ オキサリプラチン + デキサメタゾン 6.6 mg + 5%ブドウ糖 250 mL
- 点滴静注120分(125 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

SOX+Bevacizumab療法

day 2, 3

必要時 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼 内服

day1(夕)-15(朝)

エスワン

2×朝・夕食後 内服

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ペバシズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ペバシズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ペバシズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ペバシズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/
ペバシズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				