

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Pertuzumab+ 【BS】Trastuzumab療法

3週毎 コース予定

疾患名 大腸癌

主治医 指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1
パージェタ(ペルツズマブ)	【初回投与】	840 mg/body ↓
	【2回目以降】	420 mg/body
トラスツズマブBS	【初回投与】	8 mg/kg ↓
	【2回目以降】	6 mg/kg

【注意】*トラスツズマブは投与予定日より1週間を越えた後に投与する際、改めて初回投与量の8 mg/kgで投与を行う。なお、次回以降は6 mg/kgを3週間間隔で投与する。

*トラスツズマブは初回投与時90分以上かけて、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降(トラスツズマブ既接種者も含めて)の投与時間は30分間まで短縮できる。

*ペルツズマブは投与予定日より3週間以上後(前回投与日から6週間以上後)に投与する際、改めて初回投与量の840 mgで投与を行う。なお、次回以降は420 mgを3週間間隔で投与する。

*ペルツズマブは初回投与時60分かけて、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② パージェタ + 生食250 mL 点滴静注
 【840 mg投与時】 60分以上
 【420 mg投与時】 30分以上
- ③ トラスツズマブBS + 生食250 mL 点滴静注
 【8 mg/kg投与時: mg】 90分以上
 【6 mg/kg投与時: mg】 30分以上

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パージェタ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
トラスツズマブBS 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					