

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

mFOLFOX6+Cetuximab + Encorafenib療法

2週毎 コース予定

疾患名 大腸癌(BRAF陽性)

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

《注射》	day 1	day 2
アービタックス(セツキシマブ) 500 mg/m ²	↓	
レボホリナート 200 mg/m ²	↓	
オキサリプラチン 85 mg/m ²	↓	
フルオロウラシル 400 mg/m ² 点滴静注	↓	
フルオロウラシル 2400 mg/m ² 46時間持続点滴	→	→
《内服》		
ピラフトビ(エンコラフェニブ) 300 mg/day	↓ 繼続内服	

【注意】

* エンコラフェニブは連日内服する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

① 生食500 mLにて血管確保

維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠

内服

パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注

☆ 30 分後より

③ アービタックス

+ 生食 適量(全量500 mL)

点滴静注 120分(250 mL/時間)

mFOLFOX6+Cetuximab+Encorafenib療法

④ オキサリプラチン	+ 5%ブドウ糖250 mL	同時間滴下 2時間で点滴注
レボホリナート	+ 5%ブドウ糖250 mL	
⑤ フルオロウラシル	+ 生食 50 mL	点滴静注 5分(600 mL/時間)
⑥ フルオロウラシル	+ 生食 適量(全量 140mL)	
インフューザーポンプ (3.7 mL/時間) にて46時間で持続点滴		
インフューザーポンプに2日分(46時間分)を一度につめます		

day 2, 3

デキサメタゾン錠 8 mg 内服

	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/
アービタックス 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓
オキサリプラチン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓
レボホリナート 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル (全開点滴) 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル (持続点滴) 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓
確認					