

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nedaplatin + 5FU 療法

4 週毎 4~6 コース予定

疾患名 食道がん

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
アクプラ(ネダプラチン)	90 mg/m ²	↓				
フルオロウラシル持続	800 mg/m ²	→	→	→	→	→

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3 mg 1 筒 側管静注
- ③ デキサメタゾン注 9.9 mg(3 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ④ アクプラ + 生食 500 mL 点滴静注 90 分(360 mL/時間)
- ⑤ フルオロウラシル + 5%ブドウ糖 500 mL 側管より点滴静注 24 時間(20 mL/時)
- ⑥ 生食 500 mL 点滴静注 90 分(360 mL/時間)(④終了後すぐに)
- ⑦ ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 90 分(360 mL/時間)

day 2~5

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ③ フルオロウラシル + 5%ブドウ糖 500 mL 側管より点滴静注 24 時間(20 mL/時)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Nedaplatin + 5FU 療法

	コース				
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
投与日	/	/	/	/	/
アクトラ 開始時刻	↓				
5FU 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
投与日	/	/	/	/	/
アクトラ 開始時刻	↓				
5FU 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
投与日	/	/	/	/	/
アクトラ 開始時刻	↓				
5FU 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					