

Nivolumab(2週毎)+5FU+CDDP 療法<<初日に5日分調製>>

- ⑥ シスプラチン + 生食 250 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)
*生食 250 mL をバッグから前もって抜く
- ⑦ マンニトール S 300 mL 点滴静注 30分(600 mL/時間)
- ⑧ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸 K10 mEq + 硫酸 Mg 補正液 4 mEq
点滴静注 120分(250 mL/時間)
- ⑨ 生食 500 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)
- ⑩ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間
- ⑪ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間
- ⑫ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間

day 2 - 5

- ① デキサメタゾン 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ② ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間
- ③ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間
- ④ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間
- ⑤ ソルアセト F 500 mL 点滴静注 80 mL/時間

day 15

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② オプジーボ 240 mg + 生食 76 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)

day 2, 3 アプレピタントカプセル 80 mg 1×朝 内服

Nivolumab(2 週毎)+5FU+CDDP 療法<<初日に 5 日分調製>>

	コース					
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓					↓
フルオロウラシル 開始時刻	↓	→	→	→	→	
シスプラチン 開始時刻	↓					
確 認						

	コース					
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓					↓
フルオロウラシル 開始時刻	↓	→	→	→	→	
シスプラチン 開始時刻	↓					
確 認						

	コース					
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓					↓
フルオロウラシル 開始時刻	↓	→	→	→	→	
シスプラチン 開始時刻	↓					
確 認						

Nivolumab(2 週毎)+5FU+CDDP 療法《初日に 5 日分調製》

	コース					
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 15
月 日	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓					↓
フルオロウラシル 開始時刻	↓	→	→	→	→	
シスプラチン 開始時刻	↓					
確 認						