

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab+Ipilimumab療法

3 週毎【1～4回目】

疾患名 肝細胞癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	80 mg/body	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	3 mg/kg	↓

【注意】 * 他剤使用時は、ニボルマブおよびイピリムマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること
* 0.2又は0.22 μ mインラインフィルターを通して投与すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 250 mLで血管確保・維持
- ② オプジーボ 80 mg + 生食 92 mL 点滴静注30分(200 mL/時間)
◎30分間あけて
- ③ ヤーボイ + 生食 適量(全量 100 mL) 点滴静注30分(200 mL/時間)
- 投与量が100 mg未満の場合は1 mg/mLになるよう生食液量を調節する
400 mg超過の場合は生食 250 mLに変更して全量 250 mLにする
- ◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	1コース	2コース	3コース	4コース
月日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

・

・