ID
氏名

年齢
科名　　　　　　病棟

GEM＋S-1療法

3週毎　　　　　コース予定

疾患名　胆道癌

主治医　　　指導医 HBs 抗原（ ＋ － ） HBc 抗体（ ＋ － ） HCV 抗体（ ＋ － ）

スケジュール

《注射》	day1	day8	day15	
ゲムシタビン　1000 mg/m^2		↓	↓	
《内服》			day14	《7 日間休薬》
エスワン（テガフール・ギメラシル・オテラシル）	↓	･････････････････････	↓	←――→

【注意】 ＊ 発熱・発疹発現時は、ステロイドを使用すること。

エスワン

体表面積に応じて下表により1日量を決定する。
1 日 2 回朝夕食後に分服し、Day1～14 の 2 週間投与する。

（　　　　　）mg/day

体表面積	初回基準量（ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量）
1.25m^2 未満	80mg/day
1.25m^2 以上 ～ 1.5m^2 未満	100mg/day
1.5m^2 以上	120mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

（レジメン）

day 8, 15

① 生食 500mL で血管確保　　維持（20mL/時間）

② デキサメタゾン注 6.6 mg（2mL）＋ 生食 20 mL　　ゆっくり静注

③ ゲムシタビン　＋ 生食 100mL　　点滴静注 30 分（200mL/時間）

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 1- 14

エスワン　　2×朝・夕食後　　内服

	コース		コース		コース	
	day8	day15	day8	day15	day8	day15
月日	／	／	／	／	／	／
ゲムシタビン開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day8	day15	day8	day15	day8	day15
月日	／	／	／	／	／	／
ゲムシタビン開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						