

ID

氏名

年齢

科名

病棟

GEM+CDDP療法

3週毎 コース予定

疾患名 胆道癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	day15
シスプラチン	25 mg/m ²	↓	↓	休
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	休

【注意】 *1日の尿量が3000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う

*シスプラチンは遮光のこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1, 8

- ① 生食500 mLにて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② ソルデム3A 500 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)
- ③ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL
点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ④ シスプラチン + 生食 450 mL 点滴静注 120分(240 mL/時間)
*生食 50 mLをバッグから前もって抜いておく
- ⑤ ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)
- ⑥ ゲムシタビン + 生食100 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ⑦ ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)
- ⑧ ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120分(250 mL/時間)

(⑨、⑩ ソルデム 3A 500 mL 尿量をみて必要により追加)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						