

ID

氏名

年齢

科名

病棟

GEM+CDDP療法
(short hydration)

3週毎 コース予定

疾患名 胆道癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8	day15
シスプラチン	25 mg/m ²	↓	↓	休
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	休

【注意】 *1日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること

*シスプラチンは遮光のこと

*治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液 500 mLを1日2本飲水すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1, 8

- ① 生食 500 mLにて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq
点滴静注 60分(500 mL/時間)
- ③ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL
点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ④ 20%マンニトール200 mL 点滴静注 30分(400 mL/時間)
- ⑤ シスプラチン + 生食 450 mL 点滴静注 120分(240 mL/時間)
*生食 50 mLをバッグから前もって抜いておく
- ⑥ ゲムシタビン + 生食 100 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq
点滴静注 60分(500 mL/時間)

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						