

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM+S-1療法

3週毎 コース予定

疾患名 膵臓癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day1	day8	day15
ゲムシタビン	1000 mg/m ²		↓	↓
《内服》				day14 《7日間休薬》
エスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシル)		↓	↓	↓ ←

【注意】 * 発熱・発疹発現時は、ステロイドを使用すること。

エスワン

[体表面積に応じて下表により1日量を決定する。
1日2回朝夕食後に分服し、Day1~14の2週間投与する。]

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	80mg/day
1.25m ² 以上 ~ 1.5m ² 未満	100mg/day
1.5m ² 以上	120mg/day

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day8,15

- ① 生食 500mL で血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② デキサメタゾン注 6.6 mg (2mL) + 生食 20 mL 緩徐に静注
- ③ ゲムシタビン + 生食 100mL 点滴静注 30分 (200mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day1-14

エスワン 2×朝・夕食後 内服

	コース		コース		コース	
	day8	day15	day8	day15	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day8	day15	day8	day15	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						