

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

FOLFIRINOX療法

2週毎 コース予定

疾患名 膵臓癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()
スケジュール

			day1	day2
オキサリプラチン	85 mg/m ²		↓	
レボホリナート	200 mg/m ²		↓	
イリノテカン	180 mg/m ²		↓	
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	↓	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間持続点滴	→	→

【注意】 * 必要時 化学療法開始前日から半夏瀉心湯7.5g 3×毎食前 内服開始
または 重曹1.8g 3×毎食後 内服 4日間

* イリノテカン使用前に腹痛・下痢がないことを確認する。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン 3 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL
点滴静注 30分(200 mL/時間)
- ③ オキサリプラチン + 5%ブドウ糖250 mL 点滴静注 120分(125 mL/時間)
- ④ レボホリナート + 5%ブドウ糖250 mL 点滴静注 120分(125 mL/時間)
- ⑤ 【レボホリナート投与開始30分後より同時滴下】
イリノテカン + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注 90分(167 mL/時間)
- ⑥ フルオロウラシル + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600 mL/時間)

⑦ フルオロウラシル + 生食 適量(全量 140mL)

インフューザーポンプ (3.7 mL/時間) にて46時間で持続点滴

インフューザーポンプに2日分(46時間分)を一度につめます

day 2 - 4 必要時 デキサメタゾン錠 8 mg 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/	/
オキサリプラチン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
レボホリナート 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
イリノテカン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル (点滴静注) 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
フルオロウラシル (持続点滴) 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認							