

|    |    |
|----|----|
| ID |    |
| 氏名 |    |
| 年齢 |    |
| 科名 | 病棟 |

## Liposomal Doxorubicin 療法

4 週毎 3~6 コース予定

疾患名 再発卵巣癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

|                     |                      |      |
|---------------------|----------------------|------|
|                     |                      | day1 |
| ドキシル(ドキソルビシン・リポソーム) | 40 mg/m <sup>2</sup> | ↓    |

【注意】\*ドキソルビシン・リポソームは5%ブドウ糖で希釈すること。投与量が90 mg 未満の場合は250 mL で希釈し、90 mg 以上の場合は500 mL で希釈すること。

\*投与速度は1 mg/分を超えないこと。

\*ドキソルビシン・リポソームの総投与量が500 mg/m<sup>2</sup>を超えると、心筋障害によるうっ血性心不全が生じる可能性があるので注意すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

## day 1

- ① 9:00 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② 9:30 デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ③ 10:00 ドキシル + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注 120 分(125 mL/時間)

(ドキシルの投与量が90 mg 以上の場合は5%ブドウ糖量を500 mL に修正すること)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

|              | コース | コース | コース | コース | コース | コース |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 月日           | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| ドキシル<br>開始時刻 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   |
| 確認           |     |     |     |     |     |     |