

GEM 療法(3 週毎)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM 療法(3 週毎)

3 週毎 コース予定

疾患名 卵巣癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	休

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1、8

- ①生食 500 mL で血管確保 維持 (20 mL/時間)
 - ②デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
(生食 100 mL 点滴静注 30 分 (200 mL/時間)でも可)
 - ③ゲムシタビン + 生食 100 mL 点滴静注 30 分 (200 mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						