

GEM 療法(4 週毎)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM 療法(4週毎)

4週毎 コース予定

疾患名 卵巣癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15	day22
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	↓	休

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1、8、15

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ②デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
(生食 100 mL 点滴静注 30分 (200 mL/時間)でも可)
- ③ ゲムシタビン + 生食 100 mL 点滴静注 30分 (200 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻									
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻									
確認									