

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PTX+CDDP療法

3週毎 3～6コース予定

疾患名 卵巣癌

主治医      指導医      HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )、HCV抗体( )  
スケジュール

		day1
パクリタキセル	185 mg/m <sup>2</sup>	↓
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	↓

【注意】 \* パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること。

\* アルコール過敏 有・無

\* パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視

\* シスプラチンは遮光のこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保   | 維持(20 mL/時間)        |
| ② ソルラクト 500 mL   | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ③ レスタミン錠(10 mg) 5錠   | 内服                  |
| ④ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 16.5 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間)  |
| ⑤ ファモチジン 20 mg   | 側管静注                |
| <u>☆30分後より</u>   |                     |
| ⑥ パクリタキセル + 5%ブドウ糖 500 mL                                      | 点滴静注180分(167 mL/時間) |

PTX+CDDP療法

- ⑦ ソルラクト 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq  
点滴静注120分(250 mL/時間)
- ⑧ 20%マンニトール 200 mL  
点滴静注30分(400 mL/時間)
- ⑨ シスプラチン + 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注180分(167 mL/時間)
- ⑩ ソルラクト 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液4 mEq  
点滴静注120分(250 mL/時間)
- ⑪ ソルラクト 500 mL  
点滴静注120分(250 mL/時間)

day2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝昼 内服

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						