ID

氏名

年齢

科名　　病棟

PTX＋CDDP療法

3週毎　3～6コース予定

疾患名　卵巣癌

主治医　　指導医　　HBs抗原(　)、HBs抗体(　)、HBc抗体(　)、HCV抗体(　)

スケジュール

		day1
パクリタキセル	185 mg/m^2	↓
シスプラチン	75 mg/m^2	↓

【注意】 ＊ パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること。

＊ アルコール過敏　有・無

＊ パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視

＊ シスプラチンは遮光のこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

① 生食 500 mLで血管確保　　維持(20 mL/時間)

② ソルラクト 500 mL　　点滴静注120分(250 mL/時間)

③ レスタミン錠(10 mg) 5錠　　内服

④ パロノセトロン 0.75 mg ＋ デキサメタゾン 16.5 mg ＋ アロカリス 235 mg ＋ 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

⑤ ファモチジン 20 mg　　側管静注

☆30分後より

⑥ パクリタキセル　＋ 5%ブドウ糖 500 mL　　点滴静注180分(167 mL/時間)

⑦ ソルラクト 500 mL ＋ L-アスパラギン酸K 10 mEq ＋ 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注120分（250 mL/時間）

⑧ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注30分（400 mL/時間）

⑨ シスプラチン ＋ 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注180分（167 mL/時間）

⑩ ソルラクト 500 mL ＋ L-アスパラギン酸K 10 mEq ＋ 硫酸Mg補正液4 mEq

点滴静注120分（250 mL/時間）

⑪ ソルラクト 500 mL 点滴静注120分（250 mL/時間）

day2-4 デキサメタゾン錠 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						