

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM + Bevacizumab 療法

3週毎 コース予定疾患名 卵巣癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1	day8
ベバシズマブ	15 mg/kg	↓	
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓

【注意】 *ベバシズマブの点滴時間は初回投与時 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行って良い。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でも良い。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------------|
| ① | 生食 500 mLで血管確保 | | 維持(20 mL/時間) |
| ② | ベバシズマブ | + 生食 適量(全量 100 mL) | 点滴静注 90~30 分 |
| ③ | デキサメタゾン 6.6 mg | + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ | ゲムシタビン | + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 8

- | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------------|
| ① | 生食 500 mLで血管確保 | | 維持(20 mL/時間) |
| ② | デキサメタゾン 6.6 mg | + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ | ゲムシタビン | + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓		↓		↓	
ゲムシタピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓		↓		↓	
ゲムシタピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓		↓		↓	
ゲムシタピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース		コース		コース	
	day1	day8	day1	day8	day1	day8
月日	/	/	/	/	/	/
ベバシズマブ 開始時刻	↓		↓		↓	
ゲムシタピン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						