ID

氏名

年齢

科名　　病棟

CPT11＋CDDP療法

3投1休　3～6コース予定

疾患名　子宮頸癌

主治医　　**指導医**

HBs抗原(　　)、HBs抗体(　　)、HBc抗体(　　)

スケジュール

		day1	day8	day15
イリノテカン	60 mg/m^2	↓	↓	↓
シスプラチン	60 mg/m^2	↓		

【注意】 ＊ 必要時 化学療法開始前日から半夏瀉心湯7.5 g 3×毎食前 内服開始、
または重曹1.8 g 3×毎食後 内服4日間

＊ イリノテカン使用前に腹痛・下痢がないことを確認する。

＊ シスプラチンは遮光のこと。

通常量より減量する際の理由

（レジメン）

day 1

① 生食 500 mLで血管確保　　維持(20 mL/時間)

② ソルラクト 500 mL　　点滴静注120分(250 mL/時間)

③ アロカリス 235 mg ＋ パロノセトロン 0.75 mg ＋ デキサメタゾン 9.9 mg ＋ 生食 100 mL
点滴静注30分(200 mL/時間)

④ イリノテカン　＋　生食 500 mL　　点滴静注90分(333 mL/時間)

⑤ ソルラクト 500 mL ＋ L-アスパラギン酸K 10 mEq ＋ 硫酸Mg補正液 4 mEq
点滴静注120分(250 mL/時間)

⑥ 20%マンニトール 200 mL　　点滴静注30分(400 mL/時間)

⑦ シスプラチン　＋　生食 適量(全量 500 mL)　　点滴静注120分(250 mL/時間)

⑧ ソルラクト 500 mL ＋ L-アスパラギン酸K 10 mEq ＋ 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注120分(250 mL/時間)

⑨ ソルラクト 500 mL　　点滴静注120分(250 mL/時間)

day 2-4　　デキサメタゾン錠 4 mg　2錠　2×朝昼　内服

day8, 15

① 生食 500 mLで血管確保　　維持(20 mL/時間)

② グラニセトロン 3 mg　　側管静注

③ デキサメタゾン 9.9 mg　＋　生食 20 mL　　側管静注

④ イリノテカン　＋　生食 500 mL　　点滴静注90分(333 mL/時間)

◎終了後メインの輸液でルート内フラッシュして抜針

day 9･10, 16･17　　デキサメタゾン錠 4 mg　2錠　2×朝昼　内服

	1コース			2コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月　日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン開始時刻	↓			↓		
確認						

	3コース			4コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月　日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン開始時刻	↓			↓		
確認						

	5コース			6コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月　日	/	/	/	/	/	/
イリノテカン開始時刻	↓	↓	↓	↓		↓
シスプラチン開始時刻	↓			↓		
確認						