

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Weekly PTX+CBDCA 療法

3投1休 3~6コース予定

疾患名 子宮頸癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

		day1	day8	day15	day22
パクリタキセル	60 mg/m ²	↓	↓	↓	休
カルボプラチン	AUC 2	↓	↓	↓	休

【注意】* パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること

* アルコール過敏 有 ・ 無

* パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1, 8, 15

- | | |
|--|---------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持 (20 mL/時間) |
| ② レスタミン錠(10 mg) 5錠 | 内服 |
| ③ グラニセトロン注 3mg 1筒 | 側管静注 |
| ④ ファモチジン注20 mg + デキサメタゾン注9.9 mg (3 mL) | 側管静注 |

30分後より

- | | | |
|-----------|---------------|---------------------|
| ⑤ パクリタキセル | + 5%糖液 250 mL | 点滴静注 60分(250 mL/時間) |
| ⑥ カルボプラチン | + 5%糖液 250 mL | 点滴静注 60分(280 mL/時間) |

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

Weekly PTX+CBDCA 療法

	コース			コース			コース		
	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15	day 1	day 8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									