

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Pembrolizumab + Bevacizumab療法(維持療法)

3週毎 コース予定

子宮頸癌

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200 mg/body	↓
アバスチン(ベバシズマブ)	15 mg/kg	↓

【注意】 *キイトルーダはインラインフィルター(0.2または0.22 μm)を使用すること。

*アバスチンの点滴時間は 90 分かけて点滴静注、2 回目の投与は 60 分間で行って
良い。それ以降は忍容性が良好であれば、30 分間投与でも良い。

*アバスチンの併用は任意

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② キイトルーダ 200 mg + 生食 50 mL 点滴静注 30 分(100 mL/時間)
- ◎メインの生食でフラッシュ
- ③ アバスチン + 生食 適量(全量 100 mL) 点滴静注 90~30 分

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
アバスチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						