

ID

氏名

年齢

科名

病棟

主治医

指導医

スケジュール

day1		
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400 mg/body	↓

【注意】＊ 他剤使用時はペムブロリズマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。
＊ インラインフィルター(0.2または0.22 μ m)を通して投与すること。

(レジメン)

- ① 生食 250 mLで血管確保
- 維持
- ② キイトルーダ 400 mg + 生食 50 mL・
- 点滴静注30分(100 mL/時間)

希釈後最終濃度が1～10 mg/mLとなるよう生食液量を調節する

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	1 コース目	2 コース目	3 コース目	4 コース目	5 コース目
月 日	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	6 コース目	7 コース目	8 コース目	9 コース目	10 コース目
月 日	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	11 コース目	12 コース目	13 コース目	14 コース目	15 コース目
月 日	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

Pembrolizumab療法

6 週毎 15 コース予定

疾患名 局所進行子宮頸がん

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()