

ID

氏名

年齢

科名

Tisotumab Vedotin療法

3 週毎 コース予定

疾患名 子宮頸癌

主治医

指導医

HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体()

スケジュール

day1

テブダック(チソツマブ ベドチン) 2 mg/kg【最大200mg】

↓

【注意】＊本剤投与中、治療期間中はコンタクトレンズの装着を避けること

＊チソツマブ ベドチンは0.2 μ m のインラインフィルターを通して投与すること

day0 day1 day2 day3

フルメトロン点眼液0.1%

↓

↓

↓

↓

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%

↓

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%

↓

..... 点眼継続

＊チソツマブ ベドチン投与前に眼科受診し、眼の異常の有無を確認すること

＊フルメトロン点眼液0.1%を本剤投与24時間前から1日3～4回、4日間点眼すること

＊ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%を本剤投与前に1～3滴を1回両眼に点眼すること

＊本剤投与5分前より、投与終了30分後まで(65分間)は冷却パック(メーカー提供分)を必ず眼に当て冷却すること

※冷却パックは20分ごとに新しい冷却パックに交換する

＊本剤投与開始日から投与終了後30日目まで、ヒアルロン酸Na点眼液0.1%を毎日複数回点眼すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20 mL/時間)

② デキサメタゾン注 6.6 mg + 生食 20 mL

側管静注

★ テブダック投与前にフルメトロン点眼液とブリモニジン酒石酸塩点眼液を点眼していることを確認する

★ テブダック投与5分前より投与終了30分後まで冷却パック(20分ごとに交換)を必ず眼に当て冷却すること

③ テブダック mg + 注射用水 適量 + 生食 100 mL

点滴静注30分

＊1バイアルあたり注射用水 4 mLで溶解し(10 mg/mL)、必要量を抜き取る

(投与量 75mg 以下の場合、希釈後最終濃度が 1 mg/mL となるよう希釈液量を調節する)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
開始時刻								
テブダック	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
開始時刻								
テブダック	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
開始時刻								
テブダック	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
開始時刻								
テブダック	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
開始時刻								
テブダック	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻								
確認								