

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Durvalumab +PTX+CBDCA療法

3 週毎 6 コース予定

疾患名 子宮体癌

主治医

指導医

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

スケジュール

		day1
イミフィンジ(デュルバルマブ)	1120 mg/body	↓
パクリタキセル	175 mg/m ²	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓

【注意】 * デュルバルマブはインラインフィルター(0.2または0.22 μm)を使用すること

* アルコール過敏 有・無

* パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視すること

* パクリタキセルはインラインフィルター(0.2または0.22 μm)付きDEHPフリー点滴セットを使用すること

* 6コース終了後は、Durvalumab±Olaparib併用療法を継続すること。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- | | |
|--|---------------------|
| ① 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② イミフィンジ 1120 mg + 生食 77.6 mL | 点滴静注60分(100 mL/時間) |
| ◎メインの生食でフラッシュ | |
| ③ レスタミン10 mg 5錠 | 内服 |
| ④ ファモチジン 20 mg + デキサメタゾン 16.5 mg | 側管静注 |
| ⑤ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ⑥ パクリタキセル + 5%ブドウ糖 500 mL | 点滴静注180分(167 mL/時間) |
| ⑦ カルボプラチン + 5%ブドウ糖 250 mL | 点滴静注60分(250 mL/時間) |

Durvalumab+PTX+CBDCA療法

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

Day2, 3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	1コース	2コース	3コース	4コース	5コース	6コース
月日	/	/	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						