

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PTX+CBDCA療法

3~4週毎 コース予定

疾患名 子宮肉腫

主治医 指導医 HBs抗原(), HBs抗体(), HBc抗体(), HCV抗体()
スケジュール

		day1
パクリタキセル	175 mg/m ² ・	↓
カルボプラチン	AUC 5	↓

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること。

* アルコール過敏 有・無

* パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- | | |
|--|---------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② レスタミン(10 mg) 5錠・ | 内服 |
| ③ ファモチジン 20 mg + デキサメタゾン 16.5 mg | 側管静注 |
| ④ パロノセトロン 0.75 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ⑤ パクリタキセル + 5%ブドウ糖液 500 mL | 点滴静注180分(167 mL/時間) |
| ⑥ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250 mL | 点滴静注60分(250 mL/時間) |

◎ 終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 2, 3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

PTX+CBDCA療法

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					