

MTX 筋注療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

MTX 筋注療法

2 週毎 コース予定

疾患名 絨毛性疾患

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
メソトレキセート(メトトレキサート)	0.4 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓

【注意】 * メトトレキサートは上限 20 mg/body とする

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1~5

メソトレキセート + 注射用水 適量 筋肉内注射

注意: メソトレキセートは、50 mg 1 バイアルを注射用水 2 mL に溶解後[濃度:25 mg/mL]、必要量を抜き取る

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月日	/	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

MTX 筋注療法

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月日	/	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月日	/	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月日	/	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月日	/	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					