

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

アクチノマイシンD 療法

2 週毎 コース予定

疾患名 絨毛性疾患

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
コスメゲン(アクチノマイシン D)	0.01 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1

- ① 生食 500mL で血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② カイトリル注 1mg 2A + デキサメタゾン 9.9 mg (3mL) + 生食 100 mL
点滴静注 30 分 (200 mL/時間)
- ③ コスメゲン + 注射用水 20 mL + 生食 50 mL 点滴静注 5 分 (600 mL/時間)
※コスメゲンは 1 バイアルを注射用水 1.1 mL に溶解後(0.5 mg/mL)、必要量を抜き取る
◎ 終了後、メインの輸液でルート内フラッシュして抜針

day2~5

- ① 生食 500mL で血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② カイトリル注 1mg 2A + デキサメタゾン 6.6 mg (2mL)+ 生食 100 mL
点滴静注 30 分 (200 mL/時間)
- ③ コスメゲン +注射用水 20 mL+ 生食 50 mL 点滴静注 5 分 (600 mL/時間)
※コスメゲンは 1 バイアルを注射用水 1.1 mL に溶解後(0.5 mg/mL)、必要量を抜き取る
◎ 終了後、メインの輸液でルート内フラッシュして抜針

アクチノマイシン D 療法

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース				
	day1	day2	day3	day4	day5
月 日	/	/	/	/	/
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					