

MTX-LV 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# MTX-LV療法

2 週毎 コース予定

疾患名 絨毛性疾患

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原 ( + - ) HBc 抗体 ( + - ) HCV 抗体 ( + - )

スケジュール

	day1	day 3	day 5	day7
メトトレキサート(メトトレキサート) 1mg/kg【最大 50 mg/body】	↓	↓	↓	↓
-----				
☆ロイコボリンは筋注・内服どちらかを選択	day2	day 4	day 6	day8
≪筋注≫ロイコボリン注(ホリナートカルシウム) 0.1 mg/kg	↓	↓	↓	↓
≪内服≫ロイコボリン錠(ホリナートカルシウム) 7.5 mg/body				

- 【注意】 \* メトトレキサートは上限 50 mg/body とする。  
 \* ホリナートカルシウムを筋注にて使用する場合はメトトレキサート投与量の 1/10 量とする。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1,3,5,7

メトトレキサート + 注射用水 適量 筋肉内注射

注意: メトトレキサートは、50 mg 1バイアルを注射用水 2 mL に溶解後〔濃度:25 mg/mL〕、必要量を抜き取る

day2,4,6,8 ☆ 筋注・内服どちらかを選択、○をつけること

( )筋注: ロイコボリン注

または

( )内服: ロイコボリン錠 7.5 mg

MTX-LV 療法

	コース				コース			
	day1	day3	day5	day7	day1	day3	day5	day7
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
メトトレキサート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース				コース			
	day1	day3	day5	day7	day1	day3	day5	day7
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
メトトレキサート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース				コース			
	day1	day3	day5	day7	day1	day3	day5	day7
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
メトトレキサート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース				コース			
	day1	day3	day5	day7	day1	day3	day5	day7
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
メトトレキサート 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								