

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# MTX+ACT-D(MA)療法

## 2 週毎 コース予定

### 疾患名 絨毛性疾患

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原 ( + - ) HBc 抗体 ( + - ) HCV 抗体 ( + - )

### スケジュール

		day1	day2	day3	day4
メソトレキセート(メトトレキサート)	0.4 mg/kg	↓	↓	↓	↓
コスメゲン(アクチノマイシン D)	0.01 mg/kg	↓	↓	↓	↓

【注意】\* メトトレキサートは上限 20 mg/body とする。

### ☆通常量より減量する際の理由☆

#### day1

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20mL/時間)
  - ② カイトリル注 1mg 2A + デキサメタゾン 9.9 mg (3mL) + 生食 100 mL  
点滴静注 30分 (200 mL/時間)
  - ③ メソトレキセート + 注射用水 適量 筋肉内注射  
【注意】メソトレキセートは、50 mg 1 バイアルを注射用水 2 mL に溶解後〔濃度:25 mg/mL〕、  
必要量を抜き取る
  - ④ コスメゲン + 注射用水 20 mL + 生食 50 mL 点滴静注 5分 (600 mL/時間)  
※コスメゲンは 1 バイアルを注射用水 1.1 mL に溶解後(0.5 mg/mL)、必要量を抜き取る
- ◎ 終了後、メインの輸液でルート内フラッシュして抜針

#### day2~4

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20mL/時間)
- ② カイトリル注 1mg 2A + デキサメタゾン 6.6 mg (2mL) + 生食 100 mL  
点滴静注 30分 (200 mL/時間)
- ③ メソトレキセート + 注射用水 適量 筋肉内注射  
【注意】メソトレキセートは、50 mg 1 バイアルを注射用水 2 mL に溶解後〔濃度:25 mg/mL〕、  
必要量を抜き取る

④ コスメゲン + 注射用水 20 mL + 生食 50 mL 点滴静注 5分 (600 mL/時間)

※コスメゲンは1バイアルを注射用水 1.1 mL に溶解後(0.5 mg/mL)、必要量を抜き取る

◎ 終了後、メインの輸液でルート内フラッシュして抜針

	コース			
	day1	day2	day3	day4
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース			
	day1	day2	day3	day4
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

	コース			
	day1	day2	day3	day4
月日	/	/	/	/
メソトレキセート 開始時刻	↓	↓	↓	↓
コスメゲン 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				