

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM+CDDP(GC)療法

4 週毎 コース予定

疾患名 尿路上皮癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day8	day15
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓		↓	↓
シスプラチン	70 mg/m ²		↓		

【注意】*シスプラチンは遮光のこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 8, 15

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ ゲムシタビン + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg)1C を内服

- | | |
|--|-----------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② 生食 500 mL | 点滴静注 120 分(250 mL/時間) |
| ③ パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 100 mL | 点滴静注 30 分(200 mL/時間) |
| ④ ソルデム 3A 500 mL + 硫酸 Mg 補正液 4 mEq | 点滴静注 90 分(333 mL/時間) |

GEM+CDDP(GC)療法

⑤ 20%マンニトール 300 mL

点滴静注 30分(600 mL/時間)

⑥ シスプラチン + 生食 300 mL

点滴静注 180分(190 mL/時間)

※生食 200 mL をバッグから前もって抜いておく

⑦ ソルデム 3A 500 mL + 硫酸 Mg 補正液 4 mEq

点滴静注 90分(333 mL/時間)

⑧ 生食 500 mL

点滴静注 240分(120 mL/時間)

◎尿量をみて必要により補液追加

day 3, 4 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 3 - 5 デキサメタゾン錠 8 mg 内服

	コース				コース			
	day1	day2	day8	day15	day1	day2	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓	↓		↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓				↓		
確認								

	コース				コース			
	day1	day2	day8	day15	day1	day2	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓	↓		↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓				↓		
確認								

GEM+CDDP(GC)療法

	コース				コース			
	day1	day2	day8	day15	day1	day2	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓	↓		↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓				↓		
確認								

	コース				コース			
	day1	day2	day8	day15	day1	day2	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓	↓		↓	↓
シスプラチン 開始時刻		↓				↓		
確認								