

|            |
|------------|
| ID         |
| 氏名         |
| 年齢         |
| 科名 泌尿器科 病棟 |

# 乾燥 BCG【80mg/body】 膀胱内注入療法

週毎 コース予定

疾患名 尿路上皮癌

主治医 指導医 HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

|                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| イムノブラダー(乾燥 BCG) | 80 mg/body | day1<br>↓ |
|-----------------|------------|-----------|

- 【注意】 \* 注入後の最初の排尿は、BCG 感染のおそれがないよう消毒した後、廃棄すること。  
\* 接触した容器、器具等は煮沸消毒か、適切な消毒液等に浸し、消毒した後処分すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

イムノブラダー 80 mg + 生食 39 mL 膀胱内注入(尿道カテーテルよりゆっくり注入)  
(膀胱内把持時間は原則として1~2 時間とする)

|                 | 回目 | 回目 | 回目 | 回目 | 回目 |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| 月日              | /  | /  | /  | /  | /  |
| イムノブラダー<br>開始時刻 |    |    |    |    |    |
| 確認              |    |    |    |    |    |
|                 | 回目 | 回目 | 回目 | 回目 | 回目 |
| 月日              | /  | /  | /  | /  | /  |
| イムノブラダー<br>開始時刻 |    |    |    |    |    |
| 確認              |    |    |    |    |    |