

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

GEM+CBDCA 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 尿路上皮癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day8	day15
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓		↓	↓
カルボプラチン	AUC 5		↓		

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
 - ③ ゲムシタビン + 生食 100 mL 点滴静注 30 分(200 mL/時間)
- ◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 2 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C を内服

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
 - ② パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 4.95 mg + 生食 20 mL 側管静注
 - ③ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注 60 分(280 mL/時間)
- ◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

day 3, 4 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 3 - 5 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ ゲムシタビン + 生食 100 mL 点滴静注 30 分(200 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			
	Day1	Day2	Day8	Day15
月日	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓
カルボプラチン 開始時刻		↓		
確認				

	コース			
	Day1	Day2	Day8	Day15
月日	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓
カルボプラチン 開始時刻		↓		
確認				

	コース			
	Day1	Day2	Day8	Day15
月日	/	/	/	/
ゲムシタビン 開始時刻	↓		↓	↓
カルボプラチン 開始時刻		↓		
確認				

