

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab+Ipilimumab 療法

3 週毎【1～4 回目】

疾患名 腎細胞癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	240 mg/body	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	1 mg/kg	↓

【注意】*他剤使用時は、ニボルマブおよびイピリムマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

*0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持
- ② オプジーボ 240 mg + 生食 76 mL 点滴静注 30 分(200 mL/時間)
◎30 分間あけて
- ③ ヤーボイ + 生食 適量(全量 50 mL) 点滴静注 30 分
(投与量が 50 mg 未満の場合は 1 mg/mL になるよう生食液量を調節する)
◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
ヤーボイ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確 認				