ID
氏名
年齢
科名　　病棟

Nivolumab(4 週毎)＋ Cabozantinib 療法

4 週毎　　コース予定

疾患名　腎細胞癌

主治医　　指導医　　HBs 抗原(　) HBs 抗体(　) HBc 抗体(　) HCV 抗体(　)

スケジュール

《注射》		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	480 mg/body	↓
《内服》		
カボメティクス(カボザンチニブ)	40 mg/day	↓ ・・・・・・・・・ 継続内服

【注意】＊ 他剤使用時はニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

＊ 0.2 又は 0.22μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1

① 生食 250 mL で血管確保　　維持

② オプジーボ 480 mg ＋ 生食 52 mL　　点滴静注 30 分(200 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day1～継続内服　　カボメティクス 40 mg/day　1 回 40 mg　1 日 1 回

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ開始時刻								
確認								