

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Pembrolizumab+Lenvatinib 療法

6 週毎      コース予定

疾患名      腎細胞癌

主治医      指導医      HBs 抗原 ( ) HBs 抗体 ( ) HBc 抗体 ( ) HCV 抗体 ( )

スケジュール

《注射》		day1
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400 mg/body	↓
-----		
《内服》		day1
レンビマ(レンバチニブ)	20 mg/day	↓ .....

【注意】\* 他剤使用時はペムブロリズマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること

\* インラインフィルター(0.2 または 0.22 μm)を通して投与すること

\* レンバチニブは連日内服すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 250 mL で血管確保      維持
  - ② キイトルーダ 400 mg + 生食 50 mL      点滴静注 30 分(130 mL/時間)
- ◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

day 1~ レンビマ      1 日 1 回 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								