ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ALL-MRD2002 療法[B]

疾患 白血病

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4
ノバントロン(ミトキサントロン)	10 mg/m ²		↓	↓	
シタラビン	2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓
<髄注>					
メソトレキセート(メソトレキサート)	15 mg	↓			
デキサメタゾン注	3.3 mg	↓			

- 【注意】** * 1日の尿量が 2000 mL 以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
 * 治療中は、ステロイド点眼を行う。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② 髄注 メソトレキセート 15 mg + 生食 3 mL + デキサメタゾン注 3.3 mg (1mL)
(全量 4mL とし、同量の脳脊髄液採取後、ゆっくり髄注する)
- ③ グラニセトロン注 3mg 1 筒 ④施行 30 分前に静注
- ④ シタラビン + 生食 350 mL 点滴静注 180 分
*生食 150mL をバッグから前もって抜いておく

day 2, 3

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 ③施行 30 分前に静注
- ③ ノバントロン + 生食 100 mL 点滴静注 30 分
- ④ シタラビン + 生食 350 mL 点滴静注 180 分
*生食 150mL をバッグから前もって抜いておく

day 4

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3mg 1筒 ③施行 30 分前に静注
- ③ シタラビン + 生食 350 mL 点滴静注 180 分

*生食 150mL をバッグから前もって抜いておく

	day 1		day 2		day 3		day 4
月日	/		/		/		/
	髄注(MTX)	シタラビン	ノバントロン	シタラビン	ノバントロン	シタラビン	シタラビン
開始時間							
確認							